



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ленина ул., д.23, г. Орел, 302028

Тел.(486-2) 43-35-03, 43-51-55

E-mail: uzo@zdravorel.ru

18.08.2017 № 24880

На № _____

Главным врачам
(по списку)

Копия: в Департамент образования
Орловской области


Уважаемые коллеги!

Направляем Вам для проведения санитарно-просветительской работы «Памятку для родителей по вакцинации против гриппа».

Необходимо распечатать достаточное количество экземпляров и поместить памятку в учреждениях здравоохранения (регистратура, холлы, гардероб, инфекционное отделение, кабинеты врачей, центр здоровья и др.) и образовательных учреждениях (школы, детские сады, интернаты и др.)

Медицинским работникам учреждений необходимо владеть информацией в соответствии с Инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения Совигрипп для компетентных ответов на вопросы населения.

Приложение: на 1 л. В 1 экз.


Заместитель руководителя Департамента
– начальник управления


П. В. Сергеев

Информация для родителей по вакцинации против гриппа в 2017 году.

Вакцинация детей против гриппа в сезоне 2017 года будет осуществляться вакциной Совигрипп.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения в состав вакцины, используемой в сезоне 2017 года, введены частицы эпидемически актуальных штаммов вирусов гриппа подтипов А (Мичиган) и типа В (Брисбен). Вакцина предназначена для специфической профилактики гриппа у детей с 6 месяцев, **не содержит консервантов**. Содержащаяся в составе добавка Совидон положительно влияет на иммунный статус, повышает устойчивость организма к другим инфекциям.

Вакцина вводится внутримышечно в область дельтовидной мышцы (в плечо), а детям до трех лет в передненаружную часть бедра. **Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.**

В день прививки проводится осмотр врача (фельдшера) с измерением температуры.

Дети относятся к лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом. Вовремя проведенная вакцинация обеспечивает защиту от опасных осложнений (пневмонии, энцефалита и др.)

Вакцинацию проводят ежегодно в осенний период (лучшее время – сентябрь). **Детям в возрасте от 6 до 35 мес включительно вводят по 0.25 мл двукратно с интервалом 4 недели. Детям старше 36 мес и взрослым вакцину вводят однократно в дозе 0.5 мл.**

Вакцина является высокоочищенным препаратом. Местные и общие реакции, как правило, отсутствуют. Иногда в области введения могут развиваться реакции в виде болезненности, отека, покраснения кожи. Очень редко у отдельных лиц возможны общие реакции в виде недомогания, головной боли, повышения температуры, легкого насморка, боли в горле. Указанные реакции обычно проходят самостоятельно через 1-3 дня. Крайне редко, как и при любой другой вакцинации, могут наблюдаться аллергические реакции, миалгия, невралгия, неврологические расстройства.

Противопоказана вакцина лицам с аллергической реакцией на куриный белок, в период острых заболеваний (вакцинация после выздоровления).

Сообщаем также, что в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий (гриппа) осуществляется временный отказ в приеме непривитых детей в образовательные учреждения без выдачи листка нетрудоспособности.

В последние 5 лет в Орловской области не зарегистрировано поствакцинальных осложнений при вакцинации против гриппа. Не было также случаев летального исхода или осложненного течения гриппа у привитых.

Вакцинация против гриппа входит в Национальный календарь прививок.